



Dr. Dr. René Jonas

MKG Chirurgie im Zentrum Schweinfurt

Mund-, Kiefer-, plastische Gesichtschirurgie
Implantologie | Oralchirurgie | Dermatochirurgie
Konsil- und Belegarzt am Leopoldina Krankenhaus
Kooperationspartner der Klinik für MKG-Chirurgie am Universitätsklinikum Würzburg

Verhaltensempfehlungen nach KIEFER – GESICHTSCHIRURGISCHEN OPERATIONEN

Bei Ihnen wurde heute ein operativer Eingriff im Mund- Kiefer- Gesichtsbereich vorgenommen. Bei Nachlassen der Betäubung oder später, können Wundschmerzen, Schwellung von z.B. Wange, Augenlid, Kinn, Einschränkung der Mundöffnung und evtl. Schluckbeschwerden auftreten. Der Speichel wird über einige Tage rötlich gefärbt sein. Verfärbungen der Gesichtshaut und Halsregion sind möglich. In der Regel erreicht die Schwellung am 2.-3. Tag nach der Operation ihren Höhepunkt. Dies ist normal und keineswegs bedrohlich.

Bitte beachten Sie weiter folgendes:

Essen: Essen Sie erst wieder, wenn das volle Gefühl an der betäubten Stelle wiedergekehrt ist. Sie dürfen normale Kost zu sich nehmen. Schonen Sie aber beim Kauen die Wunde.

Vermeiden Sie RAUCHEN und ALKOHOL in den ersten Tagen der Wundheilung!

Schmerzen: Schmerzen sind möglich. Sie sollten die Schmerztabletten wie empfohlen einnehmen. Treten allerdings **starke Schmerzen erst nach 1 bis 3 Tagen** auf, so müssen Sie sich **sofort** zur Nachbehandlung melden.

Spülen: **Häufiges Spülen und Saugen an der Wunde schadet.** Spülen Sie zunächst nur nach den Mahlzeiten mit der empfohlenen Lösung oder mit Wasser.

Zähneputzen: Zahnpflege sorgfältig weiter betreiben. Den unmittelbaren Wundbereich vorsichtig reinigen. Wunde nicht berühren.

Nachblutung: Sollte wider Erwarten eine Nachblutung auftreten, so legen Sie eine Mullbinde, notfalls ein frisches **Stoff- Taschentuch** auf die Wunde und beißen so zu, dass der Stoff auf die Wunde gedrückt wird. **Sie sollten sich nicht hinlegen, sondern sitzen.** Wenn eine Blutung nach 1 bis 2 Stunden nicht zum Stehen gekommen ist, setzen Sie **sich mit der Praxis bzw. dem aus der Tageszeitung ersichtlichen Not- oder Sonntagsdienst in Verbindung.**

Schwellung: Nach der Operation sollten Sie die Wangen- und Gesichtsteile für 2- 3 Tage mit kalten Umschlägen **kühlen.**

Autofahren: Bedenken Sie, dass Ihre **Fahrtüchtigkeit herabgesetzt** sein kann, insbesondere wenn Sie Medikamente eingenommen haben.

Tupfer: Wurde ein Tupfer auf die frische Wunde gelegt, müssen Sie ihn **durch Aufbeißen festhalten** und nach **½ Stunde ausspucken.**

Anschließend wünschen wir Ihnen **Gute Besserung !!!**

... denn Gesundheit braucht Vertrauen!